

## **PO-2.4 Ist eine Computertomographie des Abdomens zur weiteren Abklärung bei 3-Etagen-Venenthrombose notwendig?**

Y. Grosschopf<sup>1</sup>, M. Gerstorfer<sup>1</sup>, M. Miloni<sup>1</sup>, J. Lederle<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Rottal-Inn-Kliniken Eggenfelden

**Zielsetzung:** Bei einer 3-Etagen-Thrombose unter Mitbeteiligung der Beckenachse wird vielfach als additive Untersuchung eine CT des Abdomens durchgeführt. In unserer Arbeit wollen wir die Durchführung eines CT-Abdomens bei dem genannten Krankheitsbild kritisch hinterfragen.

**Durchführung:** In unserem eigenen Patientengut haben wir die Patienten mit Beckenvenenthrombosen und die korrelierenden CT-Untersuchungen nachuntersucht. Dabei wurden unter dem Gesichtspunkt der Ausdehnung der Thrombose, sowie möglicher Tumorerkrankungen und der aus der Lokalisation der Thrombose resultierenden therapeutischen Konsequenzen die Befunde ausgewertet.

**Schlussfolgerung:** Die Indikationsstellung des CT-Abdomens ist als präoperative Diagnostik erforderlich. Sie sollte nicht standardmäßig bei allen Patienten mit einer 3-Etagenthrombose durchgeführt werden.